

مقدمه

سیتو مگالو ویروس از خانواده ویروس های هرپس یا تب خال می باشد که در افراد عادی بدون علامت اما در گیرنده گان پیوند اعضا و یا نقص سیستم ایمنی ، بیماری را به وجود می آورد.

علائم

علائم شامل موارد زیر می باشد:

➤ تب

➤ بی اشتهایی

➤ خستگی

➤ عرق شبانه

➤ درد مفاصل

➤ درد عضلات

➤ تنگی نفس

➤ اسهال

➤ سرفه های خشک

➤ تغییر آنزیم های کبدی و کلیوی می شود.

این ویروس به ارگان های مختلف حمله کرده و بر اساس درگیری هر سیستم علامتی خاص نشان می دهد.

به طور مثال در سیستم گوارشی باعث اسهال، خونریزی و درد های شکمی در پوست ضایعات

پوستی و در سیستم تنفس باعث تغییر در سرفه و تنگی نفس می شود.

راه های انتقال

➤ تزریق خون و فراورده های خونی

آلوده

➤ از مادر به بچه و شیر دهی

➤ و در صورت مثبت بودن فرد دهنده

پیوند به گیرنده

تشخیص

➤ با آزمایش خون در دوره حاد بیماری

➤ نمونه برداری از بافت مشکوک

درمان

➤ داروی آسایلکوویر و یا قرص

والسایت به مدت ۱۴ روز تا ۳ ماه با

نظر پزشک .

چند نکته مراقبتی

➤ در یک تا ۴ ماه اول بعد از پیوند

احتمال درگیری با این ویروس بیشتر

است

➤ در صورت مثبت بودن آزمایش سیتو مگالو

ویروس طبق نظر پزشک دارو درمانی شروع

می شود و هرگز بدون مشورت با پزشک

دارو را قطع نکنید

➤ احتمال عفونت با این ویروس هر زمانی وجود

دارد

➤ در هنگام درمان با دارو مایعات فراوان

توصیه می شود چون دفع دارو از طریق

کلیه ها می باشد

➤ حتماً در هنگام تهیه دارو به تاریخ انقضاء آن

توجه کنید

➤ هم بیماری هم مصرف دارو بیمار را دچار

ضعف عمومی و خستگی می کند که با بر

طرف شدن بیماری و قطع مصرف دارو بیمار

به حالت عادی بر می گردد

➤ داروی خوراکی بهتر است با غذا میل شود

➤ به هر دلیلی که به مرکز درمانی مراجعه می

کنید اعضاء تیم بهداشت را از مصرف این


دارو مطلع کنید.



فنی

مرکز آموزشی درمانی نمازی
واحد آموزش ضمن فرمت

سیتومگالو ویروس



PT-HO-76

گردآوری: الهام بیرق دار سکینه بگری کارشناس پرستاری

بازبینی: اشرف معمارزاده کارشناس ارشد NICU

استاد علمی: دکتر قنبر رئیس جلاله فوق تخصص کلیه

۱۳۹۵

منابع:

۱. سیسیل - مبانی طب داخلی ۲۰۰۸

۲. هاریسون (طب داخلی) ۲۰۱۲